


Lelki egészségünk: mikor és hogyan kérjünk segítséget?

Közérthető tájékoztató betegeknek és hozzátartozóknak · V1.3 · 2026. október 19.

1. A lelki egészség a teljes egészség része

A lelki egészséghez hozzátartozik, hogyan érezzük magunkat, miként birkózunk meg a nehézségekkel, és hogyan tudunk részt venni a családi, munkahelyi vagy közösségi életben. A nehéz érzések az élet részei. Segítségre akkor is szükség lehet, ha még nincs megállapított betegség. [1]



Magyarázó ábra a WHO szemlélete alapján; nem statisztikai mérés.

Mi befolyásolja a lelkiállapotunkat?

A testi betegségek, a tartós fájdalom, a veszteségek, az anyagi nehézségek és a magány is megterhelhetnek. A biztonságos kapcsolatok és a támogató környezet segíthetnek. A lelki nehézség nem jellemhiba, és a kialakulása nem vezethető vissza egyszerűen akaraterőre. [1]

Nem kell egyedül megoldania

A javuláshoz különböző utak vezethetnek: támogató beszélgetés, pszichológiai kezelés, az életkörülmények rendezéséhez kapott segítség, szükség esetén gyógyszeres kezelés. A megfelelő lehetőségekről az állapotfelmérés után, szakemberrel együtt érdemes dönteni. [2,3]

2. Ha a gond az élethelyzetből fakad

A munkahelyi konfliktus, a tartós túlterhelés, a családi feszültség, a gyász, a magány vagy a megélhetési bizonytalanság komoly lelki terhet jelenthet. Ezekkel akkor is érdemes segítséget kérni, ha nem gondolja magát betegnek. A munkahelyi és társadalmi környezet rendezése is része lehet a megoldásnak. [4,5]

„Nem látok kiutat”

A kilátástalanság érzése valós nehézségekhez kapcsolódhat. Ilyenkor a biztatás mellett gyakorlati segítségre is szükség lehet. Hasznos első lépés lehet egy bizalmas beszélgetés és annak közös átgondolása, melyik teher csökkenthető először, és ki tud ebben segíteni.

Milyen támogatás segíthet?

Élethelyzeti teher

Meghallgatás, kapcsolati és közösségi támogatás; a terhelés és a megoldható gondok rendezése.

Megélhetési vagy munkahelyi gond

Szociális, családsegítő vagy munkahelyi segítség; konkrét lehetőségek és követhető lépések.

Tartós vagy erős tünet, működésromlás

Egészségügyi és pszichológiai állapotfelmérés; szükség szerint szakellátás és kezelés.

A segítségformák együtt is szükségesek lehetnek. Közvetlen veszély esetén: 112.

A helyi családsegítő vagy szociális szolgáltatás a lehetőségek és az ügyintézés áttekintésében segíthet. Munkahelyi gondnál – ha biztonságosnak érzi – megbízható vezető, érdekképviselő vagy foglalkozás-egészségügyi szakember is bevonható. Családi bántalmazás esetén az Ön biztonsága az első; a közös megbeszélés nem minden helyzetben megfelelő út.

A segítségkérést nem kell addig halogatni, amíg nagyobb baj lesz. Ha a lelki teher tartós, erősödik, vagy már az alvását, munkáját, kapcsolatait is jelentősen zavarja, kérjen egészségügyi vagy pszichológiai állapotfelmérést is. Az élethelyzeti és a szakmai segítség együtt is szükséges lehet.

3. Milyen következményei lehetnek a tartós lelki tehernek?

A tartós megterhelés az egész mindennapi életre hatással lehet. Nem mindenkinél alakulnak ki az alábbi nehézségek, és a folyamat változtatható. Az élethelyzet rendezéséhez és a tünetek enyhítéséhez egyszerre is szükség lehet támogatásra.

Testi panaszok és kimerültség

Romolhat az alvás, fejfájás, gyomorpanasz, fáradtság vagy étvágyváltozás jelentkezhet. Tartós stressz mellett egy meglévő betegség is rosszabbodhat. Új vagy erős testi panasszal keressen orvost: a lelki megterhelés nem magyaráz meg automatikusan minden tünetet. [6]

Kapcsolatok, munka és életminőség

Nehezebbé válhat a figyelem, a türelem és a feladatok elvégzése. Előfordulhat visszahúzódás, több vita, munkából való kiesés vagy az örömet adó tevékenységek elmaradása. A tartós magány önmagában is kedvezőtlenül hathat az egészségre. [4,7,8]



Lehetséges folyamat, nem szükségszerű kimenetel. Szemléltető modell a WHO forrásai alapján.

A kör több ponton megszakítható: a teher csökkentésével, gyakorlati segítséggel, kapcsolati támogatással és szükség esetén kezeléssel. A cél lehet például a jobb alvás, egy megoldható ügy rendezése vagy egy fontos kapcsolat helyreállítása.

Ha egyre reménytelenebbnek érzi helyzetét, vagy önkárosító gondolata támad, kérjen mielőbb segítséget. A sürgős helyzetek teendőit külön fejezet ismerteti. Nem kell megvárni, hogy a mindennapi működése súlyosan romoljon.

4. Következmények és segítség: egy áttekintő ábra

Az ábra segít végiggondolni, hol jelentkezik a legnagyobb nehézség, és milyen támogatással lehetne kezdeni. A segítségformák a korábbi fejezetekben ismertetett szakmai forrásokra épülnek; nem helyettesítik az egyéni állapotfelmérést. [2,4,5,6]

Alvás és testi közérzet

Kimerültség, testi panaszok

Mi segíthet?

Orvosi értékelés; kiszámítható napirend

Figyelem és lelkiállapot

Türelmetlenség, nehezebb összpontosítás

Mi segíthet?

Meghallgatás; szükség szerint szakmai segítség

Család és kapcsolatok

Visszahúzódnás, feszültség

Mi segíthet?

Megbízható támogatás; a terhek megosztása

Munka és tanulás

Nehezebb feladatvégzés, kiesés

Mi segíthet?

Egyeztetett, teljesíthető feladatok és terhelés

Önellátás és szokások

A mindennapi teendők elmaradása

Mi segíthet?

Kis lépések; segítség a napi feladatokhoz

Magány és kilátástalanság

Kevesebb kapcsolat, beszűkülő lehetőségek

Mi segíthet?

Kapcsolódás; konkrét gyakorlati segítség

Lehetséges következmények és segítségformák. A támogatást az élethelyzethez kell igazítani.

Válasszon egy megvalósítható első lépést

Például kérjen időpontot, hívjon fel valakit, akiben megbízik, vagy kérjen segítséget egy konkrét ügy elintézéséhez. Nem szükséges minden problémát egyszerre megoldani. Az első lépést igazítsa az erejéhez és a ténylegesen elérhető lehetőségekhez.

Ha a panasz tartós, erősödik, vagy már jelentősen zavarja a mindennapokat, kérjen szakmai segítséget is. Bántalmazás esetén a biztonság az első: a közös megbeszélés helyett külön, biztonságos segítségre lehet szükség.

4.1. Ha nehéz elmondani, mi terheli

A lelki teher akkor is valós, ha mások előtt elvégzi a feladatait, vagy nincs megállapított betegsége. Előfordulhat, hogy könnyebb az alvásról, a fáradtságról vagy a testi panaszról beszélni. Az állapotfelméréskor az élethelyzetét is mondja el; ez segíthet a megfelelő támogatás kiválasztásában. [2,6]

Ezt a négy mondatot előre is befejezheti

Most leginkább ez terheli:

A mindennapokban ez lett nehezebb:

Ebben tudnék segítséget elfogadni:

Elsőként ehhez szeretnék visszatérni:

Például: „Édesanyámat ápolom, alig alszom, és már a munkámra sem tudok figyelni. Segítséget szeretnék a gondozás megosztásában és az alvásom rendezésében.” Ez szemléltető példa; az Ön helyzetében más lehet a legfontosabb cél.

Miben változott meg az élete?

Gondolja át, romlott-e az alvása, nehezebb-e ellátnia magát, dolgoznia vagy kapcsolatot tartania. Ha egyre több feladat marad el, visszahúzódik, vagy alkohollal, önállóan szedett nyugtatóval próbálja csökkenteni a feszültséget, ezt is mondja el. Ezek fontos információk a segítség megtervezéséhez. [6]

A segítség legyen megvalósítható

Mondja el, ha az utazás, a költség, a munkaidő vagy egy hozzátartozó ápolása miatt nem tud eljutni a megbeszélt helyre. Kérdezze meg, van-e más időpont vagy helyben elérhető lehetőség. Jegyezze fel, kit kereshet, mi lesz a következő lépés, és mikor beszélük át újra a helyzetét.

A javulást a saját életében is figyelje


Válasszon egy fontos, elérhető célt, például egy rendszeres étkezést, rövid sétát vagy egy megbízható emberrel való beszélgetést. A következő találkozón mondja el, mi lett könnyebb, mi nem változott, és mi rosszabbodott. Egy elmaradt lépés okát érdemes közösen megérteni. A cél szükség esetén módosítható.

Ha bántalmazás vagy fenyegetés terheli, kérjen lehetőséget négyszemközt beszélgetésre. Új vagy erős testi panaszt orvosnak is értékelnie kell. Közvetlen veszélyben ne a következő időpontot várja: a sürgős segítség lépéseit a 7. fejezet tartalmazza.

Ez a felkészülési segédlet nem diagnosztikai teszt. Szakmai háttér: NICE NG222 [2]; WHO Stress [6].

5. Sokan tapasztalnak lelki nehézséget

Érzelmi vagy pszichoszociális probléma az előző 12 hónapban



Adatév: 2023. Forrás: Eurobarométer, Európai Bizottság magyarországi képviselője.

A 2023-as felmérésben Magyarországon a válaszadók több mint fele jelzett valamilyen érzelmi vagy pszichoszociális problémát az előző évben. Ez tágabb kategória, mint a diagnosztizált depresszió vagy szorongásos betegség. A grafikon nem azt jelenti, hogy a lakosság 56%-ának pszichiátriai betegsége van. [9]

Milyen változásokra érdemes figyelni?

Tartós lehangoltság vagy örömtelenség; nehezen uralható aggodalom; alvási és étvágyváltozás; kimerültség; koncentrációs nehézség; visszahúzódás; a mindennapi feladatok ellátásának romlása. Ezek többféle állapothoz kapcsolódhatnak, ezért kivizsgálásuk fontos. [3]

Mikor kérjen időpontot?

Ha a lehangoltság vagy az érdeklődés elvesztése a napok nagy részében legalább két hete fennáll, kérjen szakmai segítséget. Rövidebb ideje tartó, de erősödő, súlyos vagy a működést zavaró panasszal is forduljon szakemberhez; ilyenkor ne várja meg a két hetet. [2,3]

Ha feltűnően keveset alszik, mégis szokatlanul felpörgött, vagy a viselkedése jelentősen megváltozik, mielőbbi orvosi értékelés indokolt. Új, erős testi panasz – például mellkasi fájdalom vagy nehézlégzés – sürgős testi kivizsgálást is igényelhet; nem szabad automatikusan szorongásnak tekinteni.

6. A segítségkérés gyakorlati lépései

Első lépés: mondja el, mi változott

Ha a panaszai tartósak vagy erősek, a háziorvos jó kiindulópont az állapotfelméréshez. Lelki nehézséggel pszichológiai segítséget is kereshet. Ha pszichiátriai ellátás indokolt, a területileg illetékes szakrendelés beutaló nélkül is igénybe vehető; előjegyzésre szükség lehet. Érdeklődjön a helyi fogadási rendről. [3,10]

Ki miben segíthet?

Szakember	Miben segíthet?
Háziorvos	Áttekinti a panaszokat és a testi állapotot; szükség szerint vizsgálatot, kezelést vagy további ellátást szervez.
Pszichiáter	Orvos: mentális betegséget állapíthat meg, kezelési tervet készít, és szükség esetén gyógyszert rendel.
Klinikai szakpszichológus	Pszichológiai állapotfelmérést és a képzettségének megfelelő pszichológiai kezelést végez.
Pszichoterapeuta	Pszichoterápiás szakképesítéssel rendelkező szakember; strukturált pszichoterápiát végez.

A szakemberek együtt is dolgozhatnak. A választásnál érdeklődjön a végzettségről, az ellátás formájáról, a várakozásról és az esetleges költségről. [11]

Mit vigyen a találkozóra?

Írja össze, mióta tart a panasz, hogyan változott az alvása és a napi tevékenysége, milyen gyógyszereket és készítményeket szed, illetve volt-e korábbi hasonló időszaka. Mondja el az alkoholfogyasztást vagy más szer használatát is. Ha szeretné, előzetes egyeztetés után kérjen támogatást egy megbízható hozzátartozótól.

Mit kérdezzen a kezelésről?

Mi lehet a panasz oka? Milyen lehetőségek közül választhatok? Mikor várható változás? Milyen mellékhatásra figyeljek? Mikor lesz kontroll, és kit keressek romlás esetén? Gyógyszerét ne változtassa meg és ne hagyja abba önállóan. [2]

7. Mindennapi támogatás és sürgős helyzetek

Kis lépések, elérhető célok

Próbáljon kiszámítható alvási és étkezési rendet tartani, állapotához mérten mozogni, és kapcsolatban maradni olyan emberrel, akiben megbízik. Válasszon naponta egy teljesíthető feladatot, és hagyjon időt a pihenésre. Az alkoholt és az önkényesen szedett nyugtatókat ne használja a lelki panaszok kezelésére. Ezek a lépések a szakmai segítség mellett támogatják a javulást. [1,3]

Hozzá tartozóként hogyan segíthet?

Hallgassa meg, vegye komolyan az érzéseit, és ajánljon konkrét segítséget: például időpontkérést vagy elkísérést. A „szedd össze magad” helyett mondhatja: „Látom, hogy nehéz. Segítek abban, hogy támogatást kapj.” A kapcsolat fenntartása a kezelés idején is fontos.

Azonnali segítség szükséges

Ha önmagát vagy mászt közvetlen veszély fenyeget, öngyilkossági szándék vagy kísérlet, súlyos zavartság, illetve veszélyes viselkedés jelentkezik, hívja a 112-t. A veszélyben lévő embert lehetőség szerint ne hagyja egyedül, és kövesse a segélyhívó utasításait. [11]

Lelki krízisben a Telefonos Lelki Elsősegély-szolgálat a 116123-as számon ingyenesen, éjjel-nappal elérhető. A sürgősségi segítséget közvetlen veszély esetén a 112-n kell kérni. [12]

Honnan tudhatja, hogy javul?

Figyelje, könnyebb-e aludnia, elindulnia otthonról, kapcsolatot tartania és elvégeznie a fontos napi feladatokat. A kontrollon ezeket is beszéljék át. Ha a panaszok romlanak vagy a kezelés nehézséget okoz, jelezze az ellátójának; a gondozási terv módosítható.

Ez általános tájékoztató; a személyre szabott állapotfelmérést nem helyettesíti.

8. Ellenőrzött források és további olvasnivaló

A források ellenőrzésének időpontja: 2026. október 19. A hivatkozások a tájékoztatón belül folyamatos számozásúak.

- [1] WHO: Mental health. Frissítve: 2026. szeptember 11. [Megnyitás](#)
- [2] NICE: Depression in adults: treatment and management. NG222, 2022. [Megnyitás](#)
- [3] Egészségvonal: Depresszió. [Megnyitás](#)
- [4] WHO: Mental health at work. Ellenőrzött online tájékoztató. [Megnyitás](#)
- [5] WHO: Guidance on mental health policy and strategic action plans. Module 1. 2025. [Megnyitás](#)
- [6] WHO: Stress. Kérdések és válaszok. Ellenőrizve: 2026. október 19. [Megnyitás](#)
- [7] WHO: Depressive disorder (depression). Ellenőrizve: 2026. október 19. [Megnyitás](#)
- [8] WHO: Social connection. Kérdések és válaszok. 2025. június 30. [Megnyitás](#)
- [9] Európai Bizottság Magyarországi Képvisellete: Eurobarométer – mentális egészség. 2023. október 9. [Megnyitás](#)
- [10] Egészségvonal: Járóbeteg-szakellátás. [Megnyitás](#)
- [11] Egészségvonal: Pszichiáter vagy pszichológus. [Megnyitás](#)
- [12] Telefonos Lelki Elsősegély-szolgálat: szolgáltatási adatok ellenőrizve 2026. október 19-én. [Megnyitás](#)

Rövid emlékeztető

Segítséget kérni a javulás első lépése lehet. Tartós vagy a mindennapokat zavaró panasszal keressen szakembert. Lelki krízis: 116123. Közvetlen veszély: 112.